



Prospecto  
**POMADA SALICILATO  
DE METILO COMPUESTA  
DORREGO**

### **Composición.**

Contiene cada 100 g:

#### **Principio activo:**

Ácido salicílico .....0,81g

Salicilato de metilo ....7,60 g

#### **Excipientes c.s.:**

Lanolina

Mentol

Metilparabeno

Propilparabeno

Vaselina sólida

Alcohol rectificado

#### **CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.**

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Es una pomada para uso cutáneo con acción analgésica, antiinflamatoria y que al usarla sobre la piel la enrojece y produce sensación de calor en la zona de aplicación (acción rubefaciente). Está indicada para el alivio local sintomático de dolores musculares y articulares como: lumbago, tortícolis, pequeñas lesiones deportivas y de sobreesfuerzo como esguinces leves, contusiones, torceduras leves y calambres musculares

### **¿Cómo se utiliza?**

Modo de uso : aplicar 2 o 3 veces al día sobre la zona afectada friccionando suavemente hasta la completa absorción, de acuerdo a la intensidad del dolor o inflamación o según lo indicado por su médico.

### **Conducción y uso de máquinas**

El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y manejar máquinas.

### **¿Qué precauciones deben tenerse?**

- Uso externo sobre la piel. No ingerir. No aplicar en ojos, mucosas, heridas ni piel erosionada o quemada.
- No aplicar en zonas muy extensas de la piel y evitar la exposición solar (aún estando nublado) o a las lámparas de rayos ultravioleta (UVA) de la zona tratada tras la aplicación del medicamento. No aplique éste medicamento con vendajes oclusivos.
- Si los síntomas se agravan o persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico .
- No sobrepase la dosis recomendada de 2-3 aplicaciones al día.

### **¿Cuándo no debe utilizarse?**

No utilizarse en caso de alergias a cualquiera de los componentes de la pomada: salicilato de metilo, ácido salicílico. No usar en niños menores de 12 años.

### **¿Puede afectar a otros medicamentos?**

- Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente otros medicamentos.
- Si usted está en tratamiento con warfarina (medicamento utilizado para evitar la formación de coágulos en la sangre), evite el uso crónico o en cantidades altas, ya que como este medicamento contiene salicilato de metilo y ácido salicílico podría aumentar el riesgo de sangrado que produce la warfarina.
- No es recomendable que utilice este medicamento simultáneamente con otros que también contengan analgésicos para uso cutáneo ni con medicamentos que al usarlos sobre la piel la enrojecen y producen sensación de calor en la zona de aplicación (medicamentos rubefacientes), porque se podrían potenciar los efectos adversos de ambos medicamentos.



Prospecto  
**POMADA SALICILATO  
DE METILO COMPUESTA  
DORREGO**

### **¿Qué problemas pueden producirse con su empleo?**

Trastorno de la piel y tejido subcutáneo: Este medicamento posee cierta acción rubefaciente, de manera que la presencia de calor y rubor forma parte de su actividad medicinal. Sin embargo, en algunas pieles sensibles puede producir: irritación, eritema, sensibilización alérgica cutánea o reacciones alérgicas cutáneas en la zona de aplicación, que remiten al interrumpir el tratamiento.

### **¿Puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia?**

- Consulte a su médico antes de usar el medicamento en caso de embarazo y lactancia.
- No se recomienda el uso de este medicamento en mujeres embarazadas ni en aquellas que estén amamantando a su hijo; los salicilatos se excretan en bajas concentraciones en la leche materna y, en raras ocasiones, se han observado efectos en recién nacidos/niños lactantes.

### **¿Cómo se conserva?**

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

### **Sobredosis**

Se puede alterar las condiciones normales de la piel.

En caso de ingestión de este medicamento, por su contenido en salicilato de metilo, pueden aparecer los siguientes síntomas: hiperventilación, fiebre, agitación, cetosis y alcalosis respiratoria y acidosis metabólica; depresión del sistema nervioso central que puede llevar al coma, colapso cardiovascular e insuficiencia respiratoria. En los niños, es común la aparición de somnolencia y acidosis metabólica, y puede producirse hipoglucemia grave. Pueden darse casos de salicilismo después de la aplicación tópica excesiva de salicilatos. Los síntomas incluyen mareo, tinnitus, sudoración, sordera, náuseas y vómitos, dolor de cabeza y confusión, puede ser controlado reduciendo la dosis. Asimismo, debido al contenido en mentol, la ingestión de este medicamento puede producir dolor abdominal grave, náuseas, vómitos, vértigo, ataxia, somnolencia, y coma.

**En caso de intoxicación llamar al CIAT. Tel. 1722.**

### **Presentación:**

Pomo conteniendo 40g.