

Cada comprimido contiene:

Principio activo:

Alprazolam..... 1 mg

Excipientes c.s.

Lactosa spray dried.
Celulosa microcristalina
Croscarmelosa sódica
Laurilsulfato sódico
Estearato de magnesio

MEDICAMENTO CONTROLADO

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

¿Cómo se utiliza?

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento debe ser indicado por su médico. La duración del tratamiento debe ser lo más corto posible (no debe ser superior a 12 semanas incluyendo el periodo del retiro gradual del mismo). Nunca suspenda este medicamento en forma brusca.

Indicaciones, posología y forma de administración:

El alprazolam pertenece al grupo de medicamentos denominados tranquilizantes (ansiolíticos) derivados de las benzodiazepinas.

Está indicado en el tratamiento de estados de ansiedad generalizada y trastornos de angustia con o sin agorafobia (miedo a lugares donde escapar o disponer de ayuda puede resultar difícil o embarazoso). Las benzodiazepinas no deben utilizarse solas para el tratamiento de la ansiedad asociada a la depresión. Alprazolam no está recomendado para el tratamiento de la depresión.

Dosis habituales: Para el tratamiento de los estados de ansiedad: La dosis inicial es de 0,25 mg a 0,5 mg de alprazolam 3-4 veces al día. La dosis habitual oscila entre 0,5 mg y un máximo de 4 mg al día, repartidos en 3 ó 4 tomas. Para el tratamiento de los trastornos por angustia: La dosis inicial es de 0,5 mg a 1 mg de alprazolam al acostarse. Los ajustes de dosis deben realizarse mediante incrementos no superiores a 1 mg cada 3 ó 4 días.

En pacientes de edad avanzada o con enfermedades debilitantes o con insuficiencia respiratoria crónica, alteración del hígado o riñón se puede comenzar por 0,25 mg de alprazolam dos o tres veces al día siendo la cantidad de alprazolam ingerida al día de 0,5 mg a 0,75 mg en dosis divididas, pudiendo ser aumentada de manera gradual siempre que sea necesario y bien tolerado.

Alprazolam Dorrego 1 mg se puede administrar en dosis igual o superior a 1mg.

Tómelo con un vaso lleno de agua con o sin alimentos. Si se olvida de tomar una dosis continúe con la dosis normal y nunca la duplique.

Conducción y uso de máquinas

No conduzca o maneje maquinaria después de tomar alprazolam porque puede perder la concentración o el control muscular, pérdida de memoria, tener vértigo, sentirse adormecido o mareado.

¿Qué precauciones deben tenerse?

Alprazolam Dorrego 1mg contiene lactosa si sufre intolerancia a algunos azúcares acuda a su médico antes de tomar alprazolam. Si tiene problemas de pulmón a largo plazo, problemas de hígado leves o moderados o de riñón. Si padece depresión o ansiedad asociada a depresión, ya que alprazolam puede aumentar cualquier sentimiento suicida que pueda tener. Si está tomando cualquier otro medicamento para la ansiedad o insomnio. Si tiene antecedentes de alcoholismo, drogadicción o le resulta difícil dejar de tomar medicamentos, de beber o de consumir drogas. Su médico puede ayudarle a dejar de tomar este medicamento. Si padece trastornos de la personalidad. Si es un paciente de edad avanzada, ya que alprazolam puede causar somnolencia o debilidad muscular que, a su vez, pueden ocasionar caídas, a menudo con consecuencias graves en esta población. Puede experimentar pérdida temporal de la memoria mientras esté tomando este medicamento. Para reducir el riesgo, debe procurar dormir durante toda la noche (7-8 horas) mientras esté tomando este medicamento. Alprazolam ha sido asociado con reacciones poco comunes tales como inquietud, agitación, irritabilidad, agresividad, confusión, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones (ver o escuchar cosas que no existen), psicosis (pérdida de contacto con la realidad) y conducta inadecuada. Si nota cualquiera de estos cambios en su comportamiento mientras esté tomando este medicamento, por favor póngase en contacto con su médico, ya que deberá parar el tratamiento. No beba alcohol mientras está tomando alprazolam, el alcohol aumenta los efectos de este medicamento. No beba, excesivamente, grandes cantidades de jugo de uva mientras esté tomando este medicamento, ya que puede aumentar la cantidad de alprazolam en sangre. Después del uso continuado de alprazolam puede detectarse cierta pérdida de eficacia (tolerancia).

¿Cuándo no debe utilizarse?

Hipersensibilidad a las benzodiazepinas o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento; padece miastenia gravis; padece graves dificultades respiratorias o enfermedades del pulmón; padece apnea del sueño; tiene

alteraciones graves del hígado; padece alcoholismo o adicción a las drogas; está tomando otra medicación con acción conocida sobre el sistema nervioso central (por ejemplo benzodiazepinas, neurolépticos); padece glaucoma.

Alprazolam no está recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años.

¿Puede afectar a otros medicamentos?

Si puede. Es muy importante que informe a su médico de cualquier otro medicamento que esté tomando o haya tomado recientemente o podría tener que tomar.

Depresores del sistema nervioso central pueden potenciar el efecto sedante de Alprazolam : Tranquilizantes mayores (antipsicóticos); Inductores del sueño (hipnóticos), medicamentos usados para tratar la depresión, medicamentos para el tratamiento de la epilepsia (antiepilépticos), analgésicos narcóticos (derivados de la morfina), debido a que pueden aumentar la sensación de euforia, lo que puede llevar a aumentar la dependencia psíquica, medicamentos usados para el tratamiento de la ansiedad (ansiolíticos/sedantes).

Anestésicos, antihistamínicos (medicamentos para tratar alergias) sedantes.

Hay grupos de medicamentos que por su acción en el organismo (inhibidores del citocromo P450) pueden interactuar con Alprazolam y en algunos casos aumentar su actividad, éstos son: medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones por hongos como ketoconazol, itraconazol, posaconazol o voriconazol. (No se recomienda tomarlos al mismo tiempo que Alprazolam.), los antidepresivos: nefazodona, fluvoxamina y fluoxetina, protectores gástricos como la cimetidina, dextropropoxifeno (analgésico narcótico), anticonceptivos orales, diltiazem (antihipertensivo), antibióticos macrólidos como eritromicina, troleandomicina, claritromicina y telitromicina., medicamentos utilizados para el tratamiento del SIDA como ritonavir, etc., digoxina (medicamento utilizado para suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo del corazón). El uso concomitante de este medicamento y opioides (analgésicos fuertes, medicamentos para la terapia de sustitución y algunos medicamentos para la tos) aumenta el riesgo de somnolencia, dificultades al respirar (depresión respiratoria), coma y puede ser potencialmente mortal. Si va a ser sometido a una operación en la que le vayan a suministrar anestesia general, comuníquelo a su médico que está tomando alprazolam.

¿Qué problemas pueden producirse con su empleo?

Los efectos adversos que pueden aparecer durante el tratamiento con Alprazolam ocurren predominantemente al comienzo del tratamiento y generalmente desaparecen con la administración continuada o tras una reducción de la dosis. Muy frecuentes: sueño o somnolencia; dificultad para dormir; mareos, ataxia; dolores de cabeza; dificultad para hablar; estreñimiento intenso, sequedad de boca; cansancio; aumento disminución de peso; depresión; dificultad para recordar. Frecuentes: Aumento o disminución del apetito; Visión borrosa; Sensación de estar desconectado o separado del propio cuerpo (despersonalización); Ver a otras personas y al entorno como un sueño o irreal (desrealización); Temor, nerviosismo o ansiedad, confusión, desorientación; Hormigueo, espasmos incontrolables, sacudidas o contorsiones, coordinación anormal, temblores o convulsiones, problemas con el equilibrio; Dificultad para concentrarse, falta de energía; Latidos del corazón rápidos que se perciben como punzantes en el pecho (palpitaciones); Sofocos; Congestión nasal, dolor de garganta o tos productiva (podría indicar una infección). Respiración rápida; Aumento o disminución del deseo sexual; insomnio; Sueño excesivo; Disfunción sexual; Aumento de la saliva; vómitos, molestias estomacales, diarrea, náuseas, dolor de estómago; Sudoración excesiva; Erupción cutánea, picor de la piel; Espasmos o calambres musculares, dolor de espalda, dolor muscular, dolor articular; Dolor en el pecho; Debilidad inusual; edema; Zumbidos en los oídos.

¿Puede usarse durante el embarazo o la lactancia?

No se recomienda utilizar Alprazolam durante el embarazo ni tampoco durante la lactancia (las benzodiazepinas se excretan por la leche materna) salvo que, a criterio médico, el beneficio supere el riesgo para el niño. Si por decisión del médico, se administra alprazolam durante una fase tardía del embarazo o durante el parto, podrán aparecer efectos sobre el recién nacido tales como disminución de la temperatura corporal (hipotermia), disminución del tono muscular (hipotonía) y depresión respiratoria moderada. Los niños nacidos de madres que toman benzodiazepinas de forma crónica durante el último periodo del embarazo pueden desarrollar dependencia física, pudiendo desencadenarse un síndrome de abstinencia en el periodo postnatal.

¿Cómo se conserva?

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

Sobredosis

La sobredosis con benzodiazepinas se manifiesta generalmente por distintos grados de depresión del sistema nervioso central, que pueden ir desde somnolencia hasta coma. Los síntomas incluyen somnolencia (adormecimiento), trastornos del habla (disartria), alteraciones de la coordinación, confusión, letargia (estado de somnolencia profunda y prolongada), disminución del tono muscular (hipotonía), descenso de la tensión arterial, depresión respiratoria, raramente coma y muy raramente muerte. Las secuelas serias son raras, a menos que alprazolam se tome junto con otros fármacos o alcohol

En caso de intoxicación consulte al CIAT Tel. 1722.

Presentación: Blister x 20 comprimidos.