

**Cada sobre contiene (6,975g):**

Cloruro de sodio .....	0,875g
Cloruro de potasio.....	0,375g
Citrato trisódico (como sal dihidratada).....	0,725g
Glucosa.....	5,000g

**VENTA LIBRE EN CONDICIONES REGLAMENTARIAS**

**¿Qué es y para qué se utiliza?**

SUERORAL pertenece a un grupo de medicamentos llamados formulaciones de sales para rehidratación oral.

Está indicado en la prevención y tratamiento de las deshidrataciones causadas por vómito o diarreas, ya sean de origen infeccioso o no. Diarreas del lactante (mayores de 1 mes) y estivales. Acidosis y cetosis.

**¿Cómo se utiliza?**

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento con SUERORAL debe ser indicado por su médico.

**Posología y forma de administración:**

La dosis de solución para rehidratación oral debe ser calculada individualmente en función del peso corporal, la situación y gravedad del cuadro que presente.

En general, se recomienda la siguiente posología:

Población pediátrica

Lactantes mayores de un mes:

La dosis recomendada es de aproximadamente 1 – 1,5 veces su volumen usual de alimento.

Se recomienda administrar la solución, frecuentemente, en pequeñas cantidades y lentamente.

Niños a partir de 1 año :

La dosis recomendada es de aproximadamente 200 ml por cada deposición diarreica.

Se recomienda administrar la solución frecuentemente, en pequeñas cantidades y lentamente; entre 25-30 ml de solución cada 10 minutos.

Adultos:

Se recomienda administrar de 250 a 400 ml de solución por cada deposición diarreica.

No existe una dosis máxima diaria recomendada por lo que la solución puede administrarse libremente dentro de las pautas indicadas anteriormente ya que la sed del enfermo regula la cantidad de solución necesaria.

Se recomienda continuar el tratamiento mientras dura la diarrea, y una vez finalizada ésta, hasta que el clínico aprecie que se ha conseguido la rehidratación, lo que normalmente se consigue en 4 ó 5 días.

Adultos mayores :

La pauta posológica recomendada es la misma que para adultos.

Insuficiencia hepática:

En este caso no es necesario ajuste de dosis.

Insuficiencia renal :

En pacientes con insuficiencia renal no se debe administrar en ningún caso SUERORAL polvo para solución oral

Modo de empleo:

1. Disolver un sobre de SUERORAL en aprox. 250cc de agua previamente hervida y enfriada.
2. Para preparar, agregar el polvo al agua, no el agua al polvo.
3. Administrar la solución por vía oral de acuerdo a las instrucciones suministradas por el médico.

No hervir la solución.

Si olvidó tomar Sueroral no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Siga correctamente el modo de uso y no desapareciendo los síntomas en 5 días consultar a su médico.

Descartar la solución sobrante.

### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia de Sueroral sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

### **¿Qué precauciones deben tenerse?**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar SUERORAL.

Tenga especial cuidado con SUERORAL:

- Si habitualmente consume leche de vaca no debe tomar más de 150 ml cada cuatro horas, y si la diarrea empeorase, debe suspender su consumo, sustituyéndola por otro alimento proteínico.
- La alimentación con leche materna debe continuar entre las administraciones de solución de rehidratación oral.
- La alimentación normal puede continuar cuando el déficit de fluidos inicial se ha corregido.
- Su contenido en potasio en pacientes con insuficiencia renal.
- Siga correctamente el modo de empleo y no desapareciendo los síntomas en 5 días consulte a su médico.

Este medicamento contiene glucosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento contiene 5,000 g (28 mmol) de glucosa por sobre.

Los pacientes con dietas pobres en sodio deben tener en cuenta que este medicamento contiene 512 mg (22 mmol) de sodio por sobre.

Los pacientes con insuficiencia renal o con dietas pobres en potasio deben tener en cuenta que este medicamento contiene 197 mg (5 mmol) de potasio por sobre.

### ¿Cuándo no debe utilizarse?

- Hipersensibilidad a los principios activos.
- Si tiene vómitos importantes y continuos
- Pacientes con incapacidad para la deglución.
- Si tiene una mala absorción de glucosa ya conocida
- Si es usted diabético
- Si padece obstrucción intestinal
- Si tiene insuficiencia renal
- Si tiene perforación intestinal
- **En prematuros y niños menores de 1 mes**
- En abatimiento pre-shock, en el que se debe hacer la administración oral por sonda gástrica o intravenosa de suero Ringer y otros

### ¿Puede afectar a otros medicamentos?

No se han realizado estudios de interacciones

### ¿Qué problemas pueden producirse con su empleo?

Trastornos gastrointestinales: los vómitos, pueden aparecer cuando se administra demasiado rápido. En estos casos se debe interrumpir durante 10 minutos la administración de SUERORAL y reanudarse dando cantidades menores más frecuentemente.  
En pacientes con deterioro renal, la sobredosis puede dar lugar a hipernatremia e hiperkaliemia.

### ¿Puede usarse durante el embarazo o la lactancia?

Puede administrarse durante el embarazo y la lactancia. **Consulte a su médico.**

### ¿Cómo se conserva?

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

### Sobredosis

En el caso en que se ingiera una cantidad excesiva de Sueroral puede aparecer un edema a nivel palpebral que por lo general desaparecerá al interrumpir el tratamiento.

**En caso de intoxicación llamar al CIAT. Tel. 1722**

**Presentación:** Sobres x 6,975g