

Cada comprimido contiene:

Principio activo:

Clorfeniramina maleato..... 4 mg.

Excipientes c.s.

Lactosa spray dried.....130mg

Celulosa microcristalina

Croscarmelosa sódica

Estearato de magnesio

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO

¿Qué es y para qué se utiliza?

La clorfeniramina es un antihistamínico indicado para el control sintomático de todas las reacciones alérgicas que responden a antihistamínicos, incluyendo urticaria, fiebre del heno, alergia alimentaria, reacciones a medicamentos y suero, picaduras de insectos, rinitis vasomotora y edema angioneurótico. También está indicado para el alivio sintomático de la picazón asociada con la varicela.

¿Cómo se utiliza?

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento debe ser indicado por su médico.

Posología y forma de administración:

En adultos y niños mayores de 12 años: 4 mg cada 4-6 horas. Máximo 24 mg diarios.

Adultos mayores: tienen más probabilidades de experimentar efectos anticolinérgicos neurológicos.

Se debe considerar el uso de una dosis diaria más baja (por ejemplo, un máximo de 12 mg en 24 horas).

En niños entre 6 y 12 años la dosis es de 2 mg cada 4-6 horas. Esta dosis no puede ser dispensada con Clorfeniramina Dorrego.

Tomar la dosis indicada con un vaso lleno de agua, puede administrarse junto con las comidas.

Si se olvida de tomar una dosis, espere a la siguiente. Nunca tome doble dosis para compensar la olvidada.

Conducción y uso de máquinas

La clorfenamina puede causar somnolencia, mareos, visión borrosa o falta de coordinación. No conduzca o maneje maquinaria si se ve afectado de esta manera.

¿Qué precauciones deben tenerse?

Hable con su médico si tiene epilepsia; tiene una enfermedad hepática, renal o cardíaca; hipertensión severa; tiene bronquitis, asma o bronquiectasia; tiene una próstata agrandada; aumento de la presión intraocular, incluido glaucoma. La clorfenamina puede aumentar los efectos del alcohol; **NO BEBA ALCOHOL** mientras esté tomando clorfenamina. La fórmula de Clorfenamina Dorrego 4mg contiene lactosa, si sabe que tiene intolerancia a la lactosa o otros azúcares informe a su médico.

¿Cuándo no debe utilizarse?

Si es alérgico a la clorfenamina o alguno de los demás componentes de este medicamento u otros antihistamínicos. Está tomando inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) recetados para la depresión o han tomado éstos dentro de los últimos 14 días. **No dar a niños menores de 12 años.**

¿Puede afectar a otros medicamentos?

Si puede. El uso concurrente de clorfenamina e hipnóticos o ansiolíticos puede causar un aumento en efectos sedantes, por lo tanto, se debe buscar consejo médico antes de tomar clorfenamina simultáneamente con estos medicamentos. La clorfenamina inhibe el metabolismo de la fenitoína, lo que conduce a la toxicidad de la fenitoína. Los IMAI intensifican los efectos anticolinérgicos de la clorfenamina. Informe a su médico si está tomando otros medicamentos que contienen otros antihistamínicos, incluidos productos para el alivio de resfriados y tos.



Prospecto **CLORFENIRAMINA 4mg DORREGO**

¿Qué problemas pueden producirse con su empleo?

Es probable que los niños y adultos mayores sean más sensibles a los efectos de la clorfenamina. El efecto secundario más común es la sedación, somnolencia. Pueden ocurrir los siguientes efectos secundarios:

Frecuentes: alteración de la atención, coordinación anormal, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, boca seca, fatiga, diarrea, indigestión, pérdida de apetito, dolores y molestias en el área del estómago, latidos cardíacos rápidos o irregulares, presión arterial baja, reacción alérgica grave que puede causar dificultad para respirar o mareos, erupción cutánea, enrojecimiento, picazón o urticaria, sensibilidad a la luz solar, mareos, opresión del pecho, engrosamiento de la flema, falta de coordinación, debilidad muscular, espasmos, zumbido en los oídos, irritabilidad, pesadillas, confusión, náuseas, vómitos, depresión. Los niños y los adultos mayores tienen más probabilidades de experimentar los efectos anticolinérgicos y excitación paradójica (p. ej., aumento de energía, inquietud, nerviosismo).

DEJE DE TOMAR este medicamento y dígame a su médico si experimenta: una reacción alérgica severa hinchazón de la cara, labios, boca o garganta que dificultan al respirar o tragar; piel levantada y con picazón; problemas de hígado; anemia o sangrado inexplicable o hematomas; dificultad para orinar; colapso. Consulte a su médico si presenta estos síntomas y otros no mencionados en el prospecto.

¿Puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia?

Consulte a su médico antes de usar el medicamento en caso de embarazo y lactancia. No se recomienda.

Embarazo: No se han realizado estudios controlados en humanos.

Lactancia: El maleato de clorfeniramina se excreta en la leche materna, por lo que no se recomienda su uso en periodo de lactancia. Puede inhibir la lactancia debido a sus acciones anticolinérgicas.

¿Cómo se conserva?

Conservar a temperatura ambiente entre 15-30°C. Proteger de la luz

Mantener fuera del alcance de los niños.

Sobredosis

En altas dosis puede producir sedación, estimulación paradójica del SNC, psicosis tóxica, apnea, convulsiones, efectos anticolinérgicos, reacciones distónicas y colapso cardiovascular incluyendo arritmias.

En caso de intoxicación llamar al CIAT. Tel. 1722.

Presentación:

Blister x 20 comprimidos.