



Prospecto CREMA HIDROCORTISONA 1% DORREGO

Composición

Contiene cada 100 g :

Principio activo:

Hidrocortisona base1,0g

Excipientes cs:

Alcohol cetosteárilico
2- bromo- 2 nitropropano-1,3 diol (bronopol)
Miristato de isopropilo
Estearato de polioxietileno (40)
Propilenglicol
Vaselina sólida
Vaselina líquida
Agua purificada

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO

¿Qué es y para qué se utiliza?

La hidrocortisona es un corticoesteroide con propiedades antiinflamatorias, antipruriginosas y vasoconstrictoras.

Está indicada en caso de eczemas, dermatitis alérgicas y dermatitis por seborrea.

¿Cómo se utiliza?

Modo de uso:

- Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar sobre la zona afectada en una fina película 1 ó 2 veces al día. En casos más graves puede administrarse hasta 3 ó 4 veces diarias, o según lo indicado por su médico.
- Niños menores de 12 años: igual que adultos, pero aplicar 1 ó 2 veces al día. La aplicación en niños debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Mayores de 65 años: La aplicación en mayores de 65 años debe realizarse siempre bajo supervisión médica.

¿Qué precauciones deben tenerse?

- Uso externo sobre la piel. No ingerir. Evitar cualquier contacto con los ojos o con zonas próximas a los mismos, así como las mucosas.
- El empleo continuado de Hidrocortisona 1% crema no debe ser mayor a 7 días seguidos, salvo criterio médico.
- En caso de irritación en la zona de aplicación, se debe suspender su empleo .
- Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene bronopol.
- Usar en cara el menor tiempo posible.
- No aplique éste medicamento con vendajes oclusivos salvo prescripción médica.

- Uso en niños: Se debe tener precaución especialmente cuando se trate zonas extensas o se utilice vendajes oclusivos (un pañal ajustado puede considerarse como tal) ya que favorece el pasaje sistémico de la hidrocortisona lo que puede producir efectos sistémicos tóxicos .
- Uso en mayores de 65 años: es una población particularmente susceptible a padecer efectos adversos, ya que en ellos la absorción es mayor.
- Se debe utilizar con precaución en pacientes que padecen: Diabetes mellitus, Tuberculosis, Infecciones en la zona de tratamiento, enfermedades cutáneas que pueden dar lugar al adelgazamiento de la piel y fácil aparición de hematomas y pacientes con insuficiencia hepática .

Conducción y uso de máquinas

No se han descrito.

¿Cuándo no debe utilizarse?

Hipersensibilidad a la hidrocortisona o alguno de los excipientes, piel infectada, heridas, acné, pie de atleta, úlceras de encamados, escorceduras o irritaciones de los pañales, mucosas (anal, genital, bucal).

¿Puede afectar a otros medicamentos?

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente otros medicamentos en la misma zona a tratar.

No se han detectado interacciones con otros fármacos en las condiciones de uso recomendadas .

¿Qué problemas pueden producirse con su empleo?

- A las dosis recomendadas el empleo de hidrocortisona por vía tópica raramente se asocia a la aparición de reacciones adversas sistémicas.
- Su uso prolongado, dosificación alta, u oclusión del lugar puede producir: Reacción alérgica, eritema, erupción, reacciones locales en el sitio de aplicación ,atrofia de la piel, fragilidad de la piel, foliculitis, acné, telangiectasias, estrías rojizas en la piel, hipertrichosis, hiperpigmentación de la piel, S. de Cushing, hiperglucemia, glucosuria, trastornos hipotálamo hipofisarios, taquifilaxia y fenómeno rebote.
- Estos efectos desaparecen al suprimir el tratamiento o reducir la frecuencia de administración.

¿Puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia?

- No debe usar crema Hidrocortisona 1% Dorrego durante el embarazo ni la lactancia a menos que su médico lo considere conveniente.

Durante el primer trimestre de embarazo no deben aplicarse sobre la piel medicamentos que contengan corticoides.

Si su médico le receta crema Hidrocortisona 1% Dorrego durante el embarazo o la lactancia, no debe utilizarlo en zonas extensas de su cuerpo, ni durante largos periodos de tiempo, ni utilizar vendajes oclusivos.

No aplique crema en las mamas durante la lactancia; no ponga al niño en contacto con áreas tratada.

¿Cómo se conserva?

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Sobredosis

En caso de intoxicación (sobredosis o ingestión accidental), llamar al CIAT. Tel. 1722.

En caso de uso prolongado o en grandes superficies, aumenta la manifestación de sus reacciones adversas.(ver ¿que problemas pueden producirse con su empleo?)

Presentación:

Pomo conteniendo 15g.