Ministerio de Salud Pública
DPS
Ciclos de Vida
Programa Nacional de Salud de la Niñez

"La leche Materna es la Mejor para el Recién Nacido y el Lactante"

<u>Campaña de nivelación con vacuna conjugada antineumocócica 13 valente.</u>

La campaña de nivelación con vacuna conjugada antineumocócica 13 valente (PCV 13) comenzó el **26 de abril y finalizará el 31 de julio de 2010** para asegurar que los niños implicados reciban la vacuna antes del finalizar la temporada invernal**.** Esta dirigida a prevenir las infecciones invasivas neumococicas en niños de 2 a 5 años (neumonia y meningitis) causa importante de morbimortalidad.

¿A que niños es necesario vacunar?

La población objetivo son 180.000 niños y comprende **todos los niños nacidos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008.**

Por lo tanto:

Los niños nacidos durante los años 2005 y 2006 recibirán 1 dosis de PCV 13.
Los niños nacidos en 2007, que recibieron 1 ó 2 dosis de vacuna conjugada antineumococica 7 valente (PCV 7), recibirán 1 dosis de PCV 13.
Los niños nacidos en el año 2008, que recibieron el esquema habitual de PCV 7, recibirán 1 dosis de PCV 13.

¿Qué sucede si el niño recibió vacuna polisacaridica 23 valente?

Aquellos niños de edades comprendidas en la campaña de nivelación que, por alguna razón recibieron vacuna antineumocócica 23 valente, ***deben recibir la PCV 13*** según el esquema antes mencionado.

<u>Se recuerda a todos los profesionales de salud, incluido las vacunadoras que</u>:

- La vacunación es gratuita.

- No se necesita indicación para esta vacunación. No se debe exigir indicación escrita.

- Se puede administrar junto a otras vacunas.

- El resfrío común y la toma de antibióticos, no constituyen contraindicaciones.